



※注意：袋內有防腐劑

6N HCl 鹽酸(液體)

6N HNO<sub>3</sub> 硝酸(液體)

NaOH (氫氧化鈉)

Boric acid (硼酸粉末)

- 防腐劑為具腐蝕性對人體有害的化學品，請存放小孩不易取到的地方。若不小心發生皮膚或眼睛接觸時，請以大量清水沖洗 20~30 分鐘並立即就醫。若不小心誤食時，切勿催吐(有穿孔的危險!)，如果意識清楚先以清水徹底漱口並喝水(約 240~300 毫升)，若有牛奶，喝水後可再喝牛奶並立即就醫；如果意識不清楚或已喪失意識或痙攣時，勿餵食任何東西，請立即送醫。
- 收集尿液期間請正常飲水
- 女性月經期間請勿採檢
- 尿液須存放於室溫環境低溫環境(如冷藏冰箱或放置冰塊之冰桶中)
- 收集 24 小時尿液完成後，從尿袋所附之刻度計算尿總量，並請您將尿總量及開始留存時間紀錄於試管標籤上。
- 將尿液輕微搖晃混合均勻後，取袋內尿液置於尿液試管中，將尿液試管送至門診檢驗室，空的尿袋可帶來醫院丟棄。
- 如您有任何問題或不清楚的地方請來電詢問，諮詢電話(04)7238595 轉分機 7273(門診檢驗室)。
- 

衛教人員：\_\_\_\_\_

6810-單張-中文-006-11

參考來源：6810-SOP-08-001

※注意：袋內有防腐劑

6N HCl 鹽酸(液體)

6N HNO<sub>3</sub> 硝酸(液體)

NaOH (氫氧化鈉)

Boric acid (硼酸粉末)

- 防腐劑為具腐蝕性對人體有害的化學品，請存放小孩不易取到的地方。若不小心發生皮膚或眼睛接觸時，請以大量清水沖洗 20~30 分鐘並立即就醫。若不小心誤食時，切勿催吐(有穿孔的危險!)，如果意識清楚先以清水徹底漱口並喝水(約 240~300 毫升)，若有牛奶，喝水後可再喝牛奶並立即就醫；如果意識不清楚或已喪失意識或痙攣時，勿餵食任何東西，請立即送醫。
- 收集尿液期間請正常飲水
- 女性月經期間請勿採檢
- 尿液須存放於室溫環境低溫環境(如冷藏冰箱或放置冰塊之冰桶中)
- 收集 24 小時尿液完成後，從尿袋所附之刻度計算尿總量，並請您將尿總量及開始留存時間紀錄於試管標籤上。
- 將尿液輕微搖晃混合均勻後，取袋內尿液置於尿液試管中，將尿液試管送至門診檢驗室，空的尿袋可帶來醫院丟棄。
- 如您有任何問題或不清楚的地方請來電詢問，諮詢電話(04)7238595 轉分機 7273(門診檢驗室)。

衛教人員：\_\_\_\_\_

6810-單張-中文-006-11

參考來源：6810-SOP-08-001



- 收集尿液期間請正常飲水
- 女性月經期間請勿採檢
- 尿液須存放於**低溫環境**(如冷藏冰箱或放置冰塊之冰桶中)
- 收集 24 小時尿液完成後，從尿袋所附之刻度計算尿總量，並請您將尿總量及開始留存時間紀錄於試管標籤上。
- 將尿液輕微搖晃混合均勻後，取袋內尿液置於尿液試管中，將尿液試管送至門診檢驗室，空的尿袋可帶來醫院丟棄。
- 如您有任何問題或不清楚的地方請來電詢問，諮詢電話(04)7238595 轉分機 7273(門診檢驗室)。

衛教人員：\_\_\_\_\_

6810-單張-中文-006-11  
參考來源：6810-SOP-08-001



- 收集尿液期間請正常飲水
- 女性月經期間請勿採檢
- 尿液須存放於**低溫環境**(如冷藏冰箱或放置冰塊之冰桶中)
- 收集 24 小時尿液完成後，從尿袋所附之刻度計算尿總量，並請您將尿總量及開始留存時間紀錄於試管標籤上。
- 將尿液輕微搖晃混合均勻後，取袋內尿液置於尿液試管中，將尿液試管送至門診檢驗室，空的尿袋可帶來醫院丟棄。
- 如您有任何問題或不清楚的地方請來電詢問，諮詢電話(04)7238595 轉分機 7273(門診檢驗室)。

衛教人員：\_\_\_\_\_

6810-單張-中文-006-11  
參考來源：6810-SOP-08-001