

彰化基督教醫院 檢驗醫學部
糞便寄生蟲檢驗採集須知



1. 採檢注意事項：

- (1) 在抗生素或止瀉劑使用前收集糞便。
- (2) 糞便收集前，避免使用礦物油、鉍劑(bismuth)或鉬劑(barium)。
- (3) 可於馬桶或便盆解便，坐式馬桶解便時應盡可能解在馬桶前端，不要解在水中，若為蹲式馬桶或便盆則盡可能取未沾水或尿液之糞便。
- (4) 使用一般糞便收集瓶蓋之杓子，挖取約「一顆帶殼花生米」大小的糞便量，請挖取含血液、膿液或黏液的糞便，「最好從糞塊的三個不同部位採樣」連同杓子鎖緊於收集盒；檢體量過少時，會造成寄生蟲數量過少，導致報告結果偽陰性。
- (5) 若為液狀糞便，以立寶糞便採檢瓶瓶蓋之杓子取 2 mL 放入採檢瓶，連同杓子鎖緊於採檢瓶。

2. 儲存條件：採檢後室溫下一小時內立即送檢。

門診檢驗室(173 診)服務時間：
週一至週五：6：30-22：00
週六：6：30-14：00
電話：(04)7238595 轉分機 7273
6810-單張-中文-014-03

兒童醫院檢驗室(229 診)服務時間：
週一至週五：8：30-21：30
週六：8：30-13：30
電話：(04)7238595 轉分機 1229
參考來源 6810-SOP-08-001

彰化基督教醫院 檢驗醫學部
糞便寄生蟲檢驗採集須知



1. 採檢注意事項：

- (1) 在抗生素或止瀉劑使用前收集糞便。
- (2) 糞便收集前，避免使用礦物油、鉍劑(bismuth)或鉬劑(barium)。
- (3) 可於馬桶或便盆解便，坐式馬桶解便時應盡可能解在馬桶前端，不要解在水中，若為蹲式馬桶或便盆則盡可能取未沾水或尿液之糞便。
- (4) 使用一般糞便收集瓶蓋之杓子，挖取約「一顆帶殼花生米」大小的糞便量，請挖取含血液、膿液或黏液的糞便，「最好從糞塊的三個不同部位採樣」連同杓子鎖緊於收集盒；檢體量過少時，會造成寄生蟲數量過少，導致報告結果偽陰性。
- (5) 若為液狀糞便，以立寶糞便採檢瓶瓶蓋之杓子取 2 mL 放入採檢瓶，連同杓子鎖緊於採檢瓶。

2. 儲存條件：採檢後室溫下一小時內立即送檢。

門診檢驗室(173 診)服務時間：
週一至週五：6：30-22：00
週六：6：30-14：00
電話：(04)7238595 轉分機 7273
6810-單張-中文-014-03

兒童醫院檢驗室(229 診)服務時間：
週一至週五：8：30-21：30
週六：8：30-13：30
電話：(04)7238595 轉分機 1229
參考來源 6810-SOP-08-001