

彰化基督教醫院 檢驗醫學部
糞便寄生蟲檢驗採集須知



1. 採檢注意事項：

(1) 採檢容器

(A) 液狀糞便：使用立寶糞便採檢瓶

(B) 固狀糞便：使用一般糞便採檢瓶

(2) 在抗生素或止瀉劑使用前收集糞便。

(3) 糞便收集前，避免使用礦物油、鉍劑(bismuth)或鉬劑(barium)。

(4) 可於馬桶或便盆解便，坐式馬桶解便時應盡可能解在馬桶前端，不要解在水中，若為蹲式馬桶或便盆則盡可能取未沾水或尿液之糞便。

(5) 使用一般糞便收集瓶蓋之杓子，挖取 2g 約 **一顆帶殼花生** 大小的糞便量，請挖取含血液、膿液或黏液的糞便，連同杓子鎖緊於收集盒。

(6) 若為液狀糞便，則以滴管吸取 2 mL，放入立寶糞便採檢瓶。

(7) 糞便檢體量過多時(超出 2/3)，會造成糞便收集瓶太滿而影響操作；檢體過多溢出導致收集瓶遭汙染，可能危害操作人員安全，而檢體可再取得，則退件處理。

2. 檢體傳送要求：採檢後 40 分鐘內室溫送達。

門診檢驗室(173 診)服務時間：

週一至週五：7：00-22：00

週六：7：00-14：00

電話：(04)7238595 轉分機 7273

6810-單張-中文-014-06

兒童醫院檢驗室(229 診)服務時間：

週一至週五：8：30-21：30

週六：8：00-13：30



電話：(04)7238595 轉分機 1229

參考來源 6810-SOP-08-001

彰化基督教醫院 檢驗醫學部


糞便寄生蟲檢驗採集須知

固狀糞便：使用一般糞便收集瓶



1. 將糞便排入乾淨且乾燥容器中，挖取未沾水或尿液之糞便

2. 挖取2g約一顆帶殼花生大小的糞便量，請挖取含血液、膿液或黏液的糞便





室溫40分鐘內送檢

3. 糞便檢體置入收集瓶



4. 鎖緊收集瓶

液狀糞便：使用立寶糞便採檢瓶



1. 將糞便排入乾淨且乾燥容器中

2. 打開採檢瓶



室溫40分鐘內送檢

3. 以滴管吸取2 mL糞便

4. 蓋上蓋子旋緊