

彰化基督教醫院 檢驗醫學部
糞便寄生蟲檢驗採集須知



1. 採檢注意事項：

- (1) 在抗生素或止瀉劑使用前收集糞便。
- (2) 糞便收集前，應避免使用礦物油、鉍劑(bismuth)或鉬劑(barium)。
- (3) 可於馬桶或便盆解便，於坐式馬桶解便時應盡可能解在馬桶前端，不要解在馬桶水中，若為蹲式馬桶或便盆則盡可能取未沾水或尿液之糞便。
- (4) 使用一般糞便收集瓶蓋之杓子，挖取約一顆帶殼花生米大小的糞便量，請盡量挖取含血液、膿液或黏液處的糞便，「最好從糞塊的三個不同部位採樣」。採檢好連同杓子將糞便鎖緊於收集盒內。
- (5) 檢體量過少時，會造成寄生蟲數量過少，導致報告結果偽陰性；但也應避免因採檢過多，導致外漏污染檢體收集瓶。
- (6) 若為液狀糞便，以立寶糞便採檢瓶瓶蓋之杓子取 2 mL 放入採檢瓶，將糞便連同杓子鎖緊於採檢瓶中。

2. 儲存條件：採檢後於室溫一小時內立即送檢。

門診檢驗室(173 診)服務時間：

週一至週五：7：00-22：00

週六：7：00-14：00

電話：(04)7238595 轉分機 7273

6810-單張-中文-014-05

兒童醫院檢驗室(229 診)服務時間：

週一至週五：8：30-21：30

週六：8：00-13：30

電話：(04)7238595 轉分機 1229

參考來源 6810-SOP-08-001

糞便檢驗檢體採集須知



糞便不得混有尿液、消毒水或污水

採取量約帶殼花生米大小

蓋子旋緊後盡速送檢



若為液狀糞便，以立寶糞便採檢瓶瓶蓋之杓子取 2mL 放入採檢瓶，鎖緊於採檢瓶。

***採檢後室溫下一小時內立即送檢